

<sup>a</sup> Celsus.

Celsus et Philotimus aliter credidisse putentur. Infipidos esse nisi cum suis faecibus edantur, creditum apud

Graecos. Jecur in cibo sumptum ietericis prodesse, apud Aelianum legimus. <sup>s' Aelian. H. A. l. 14. c. 2.</sup>

## ARTICULUS II.

## De Turdo.

TAB. XIII. <sup>5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.</sup> **T**urdus Graecis *τύχλη* a macula-  
rum similitudine sic dictus, *πολύγυμος* olim teste Nicandro et Pan-  
crate apud <sup>a</sup> Athenaeum fuit. Duo  
ipsorum Genera constituit Salvianus,  
*Majorem* et oblongum, qui vel viridis vel ruber est. Rondeletius duodecim species pinxit. Veteribus,  
apud Athenaeum *μελανίσιτος*, seu  
nigris oculis varius. Eratostheni  
*πέργας* seu nigro distinctus, Pancratii  
*οινώδης* quasi vini colorem referens,  
Numenio *άλειδης*, id est purpureus  
dicitur. Phavorinus *ποτιλόζιτον* vocavit.  
Mutare tamen colorem di-  
cuntur. <sup>b</sup> Circa ver magis exsatu-  
<sup>A. l. 8. c. ult.</sup> ratos, dilutos magis aestate videoas.  
Branchias ipsis quaternas Aristote-  
<sup>c</sup> Aristot. H. les tribuit omnes duplii ordine ex-  
<sup>A. l. 2. c. 13.</sup> cepto novissima. Quinque sunt ab  
Aldroyando observati, duodecim a  
Rondeletio. *Primus*, qui magna  
ex parte aureus, amethystino, cae-  
ruleoque ac rubro variat, os intus  
habet ruberrimum, dentibus carens.  
Oculos maximos, quorum auream  
pupillam circulus ambit niger, ni-  
grum rursus aureus, aureum cae-  
ruleus, hunc iterum aureus, ac tan-  
dem niger, alias omnes ambit. Ha-  
bet et duas e mento dependentes  
apophyses cutaceas, subflavi colo-  
ris; tres prae caeteris lineas sanguineas,  
et denticulatas. Pinnas ad  
branchias omnino aureas, in pecto-  
re totas caeruleas, nervos earum au-  
reos. Cujus coloris sunt et illae,  
quae ab ano, in dorso et cauda, qua-  
uropygio junguntur, maculis dun-  
taxat parvis sanguineis respersas, cae-  
teras caeruleas conspicias. *Secun-  
dus* ad latera non nihil albicat; in  
capite vermicularibus, alibi rotundis,  
ubique caeruleis maculis insigni-  
tur. Tergoris pinna ex aureo ru-  
bet, sicuti et cauda, quae in extre-  
mo caerulea est. Utrinque denta-  
tus est. *Tertio* Corpus subviret,

venter albicat. Squamarum ex-  
tremitates caeruleae sunt. *Caput*  
pro corporis proportione parvum,  
totum caerulei sed dilutionis coloris,  
praeter branchiarum opercula, quae  
candidant, maculisque oblongis et  
femicircularibus aureis consperguntur.  
Eiusdem coloris linea decus-  
fatim et transversaliter per corpus  
ducuntur. Dentes habet maximos,  
acutissimos, ingentemque oris ri-  
ctum. *Quartus* toto corpore sanguineo,  
aureoque distinguitur; dorsum  
et corporis maculae ex caeruleo ni-  
gricant. *Quintus* *πολύγερμος*, to-  
tus ruber saturatus. Maculae in ex-  
tremo tergere conspicuae, Orrisces  
non absimiles, sunt nigrae, in capite  
longae, et serpentis in morem fere  
contortae, caeruleae. Lineae a ca-  
pite ad caudam recta ductae, rubrae  
sunt.

*Turdus Rondeletii Primus* admo-  
dum varius est. Unde *αιολος* dictus;  
ad auratae figuram accedens, pinna-  
rum situ numeroque caeteris faxatilibus  
similis, dorso fusco, ventre ex al-  
bo livecente. Dentes habet recur-  
vos, labra crassa, et rugosa. Oculos  
sub quibus pars variis coloribus est  
illustris, magnos et rotundos. Pin-  
nas ad branchias aureas, ad podi-  
cem et in tergo flavas, nigris cae-  
ruleisque maculis aspersas. *Alter* co-  
lore est ex viridi caeruleo, et quia  
colorem colli Pavonis in pinnis et in  
cauda refert, *Pavo* dicitur. *Terti-  
us* qui *Pulcher* dicitur, et a qui-  
busdam *ferculum regium*, multis  
colorum differentias habet. Viri-  
dis est magna ex parte, sed pun-  
ctis purpureis, caeruleis, Indicis,  
et aliis confusis coloribus consper-  
sus; pinnis ad branchias flavis seu  
rufis, aliis omnibus partim cae-  
ruleis, partim viridibus, partim rufis.  
Branchiarum operculis punctis et li-  
neis