

tale e pel fondo umido e paludoso in cui il fiume divaga ad oriente di Novoselo.

Il Kamčija risulta dalla riunione del Grande e del Piccolo Kamčija (1), di cui il primo si snoda a N., il secondo a S. dell'asse balcanico; quest'ultimo fiume intaglia perciò la fascia più elevata dello Stara Planina nella sua porzione estrema orientale con una lunga gola di sovrimposizione, a valle di Diskotna. L'uno e l'altro ramo hanno del resto carattere epigenetico in più tratti del loro corso, e conseguentemente pendenza diversa da tratto a tratto; tipico nel Grande Kamčija il solco con cui il fiume attraversa il compatto e relativamente alto (736 m.) sprone calcareo del Preslavka Planina. In epoca pliocenica il Piccolo Kamčija trovava esito direttamente al Mar Nero, seguendo il decorso segnato oggi dal suo affluente Bogaz dere e dallo Hadži dere, il cui spartiacque corrisponde ad una zona a rilievo, ed in parte anche a deflusso, indeciso (2). Riunitisi, il Grande e il Piccolo Kamčija, presso il villaggio di Sandăkčii, la valle si svasa e il fondo si fa acquitrinoso, dilatando da 3 a 4 km., tutto nascosto da una fitta foresta di latifoglie, una delle più vaste e meglio conservate di tutta la Bulgaria (3). Alla foce, il fiume ha una profondità di circa 5 m. e le barche potrebbero risalirlo fino alla con-

---

(1) In bulgaro più di frequente Golema e Malka Kamčija; accanto a queste si usano però spesso (e tanto più in alcuni tratti dei due corsi) le forme *buyuk* e *akalli* nel primo caso, *deli* e *luda* nel secondo. Contro ciò che potrebbero far credere questi appellativi, il Golema Kamčija ha corso meno lungo (195 km.) del Malka (205,5 km.); l'epiteto è però giustificato dalla molto maggiore ampiezza del bacino (3759 contro 1388 kmq.); cfr. ISCHIRKOFF (A.), *op. cit.*, 143-5.

(2) Cfr. a questo proposito quanto è detto nella n. 1 a p. 74, e CVIJIĆ (J.), *Das pliozäne Flusstal* etc. cit., pp. 35 e segg.

(3) Per questa zona, cfr. più innanzi a proposito delle condizioni fitogeografiche della Bulgaria.